



Liletta Intrauterine System (IUD) Post-Insertion Instructions

What you should know:

An intrauterine system, or IUD, is a very effective form of birth control. An IUD consists of a small, flexible piece of plastic with a string on the end of it. Today, you have had a Liletta IUD put into your uterus by a health care provider. A Liletta IUD slowly releases the hormone progestin that acts only in the uterus. It lasts for 8 years. A health care provider can remove it anytime.

After you go home:

- Medicines:
 - Ibuprofen 400-800mg (2-4 tabs) every 4-8 hours as needed for pain or cramping for the first 2-3 days. Don't take Ibuprofen on an empty stomach.
 - If you cannot take Ibuprofen, then you can take Regular strength Tylenol 325-650 mg (1-2 tabs) every 4-6 hours **or** Extra strength Tylenol 500-1000mg (1-2 tabs) every 6-8 hours, as needed for pain or cramping for the first 2-3 days.
 - Do not exceed recommended dosage listed on bottle for Ibuprofen or Tylenol
 - Do not take either medication if you are allergic or sensitive to the medication
- The IUD protects you from pregnancy immediately if inserted within 7 days of the start of your period. If the IUD was not inserted within 7 days of the start of your period, then finish your current cycle of birth control or use condoms for 7 days.
- You may have sex, swim, bathe, exercise or use tampons as soon as you want to.
- The most common side effect with Liletta is irregular bleeding or spotting, although overall blood loss and cramping is less. Many women will have very light periods or no periods at all several months after insertion.

Return to the clinic:

- At your yearly review or if you have any problems or concerns.

Call the clinic:

- If you have one or more signs of an infection, which may include:
 - Shaking, chills, or an unexplained fever over 101.0 degrees.
 - Vaginal discharge that is green, yellow, has a bad smell, or looks like pus.
 - Severe abdominal (belly) pain that does not decrease with pain medicine.

- If you have abnormal vaginal bleeding

If any of these things above occur and it is outside of clinic hours:

- ◆ Call University of Colorado Hospital: (720) 848-9111
- ◆ Go to urgent care, the nearest hospital or call 911.
- If you think you might be pregnant.
- If you or your partner has pain during sex. (Your partner may feel the string during sex, but it should not hurt him.)
- If you cannot feel the IUD strings, the strings feel longer, or you feel the hard plastic end of the IUD itself. If this happens, you need to have your IUD checked as soon as possible. Until you are checked, use another form of birth control (like foam and condoms).

Checking your IUD:

- An IUD can come out of your uterus and your vagina without you knowing it, so it is important to check your IUD regularly.
- Check your IUD once a month. Preferably after your period if you have one with your IUD.
- Do the following to check the placement of your IUD:
 - Wash your hands with soap and water. Dry with a clean towel.
 - Bend your knees and squat low to the ground or put one foot up on the toilet seat.
 - Gently put your index (pointer) finger deep inside your vagina.
 - Find your cervix at the top of your vagina (feels like the tip of your nose).
 - Feel for the IUD strings coming from the middle of the cervix. DO NOT pull on the string.
 - You should NOT be able to feel the hard plastic of the IUD.
 - Wash your hands after you are done checking your string.

*As a reminder: **Liletta IUD will not protect you from Sexually Transmitted Infections!**

"This brochure was developed (in part) with federal funds from the Office of Population Affairs grant."



Liletta - Sistema Intrauterino (IUD) Instrucciones para Desp  s de la Inserci  n

Debe saber lo siguiente:

Hoy se le coloc   en el   tero el sistema intrauterino Liletta. Un sistema intrauterino, conocido en ingl  s como IUD, es un m  todo muy efectivo para el control de la natalidad. Un IUD consiste en una peque  a y flexible pieza de pl  stico con un hilo en un extremo. El IUD Liletta suelta la hormona progestin lentamente y afecta s  lo el   tero. Dura 8 a  os. Un m  dico se lo puede remover en cualquier momento.

En casa:

- Medicamentos:
 - Ibuprofeno 400-800mg (2-4 pastillas) cada 4 a 8 horas, seg  n lo necesite para dolor o colicos en los primeros 2-3 d  as. No tome ibuprofeno con el est  mago vac  o.
 - Si no puede tomar el ibuprofeno, puede tomar 325 a 650 mg (1-2 pastillas) de Tylenol cada 4 a 6 horas o Tylenol Extra fuerte 500-1000 mg (1-2 pastillas) cada 6-8 horas seg  n lo necesite por el dolor o los calambres en los primeros 2-3 d  as.
 - No exceda la dosis recomendada en el frasco para ibuprofeno o Tylenol
 - No tome ninguno de los medicamentos si es al  rgica o es sensible al medicamento.
- El IUD la protege inmediatamente contra el embarazo si se inserta dentro de siete d  as despu  s del comienzo de su menstruaci  n. Si el IUD no se inserta en esos siete d  as, termine el actual ciclo de su m  todo para el control de la natalidad o use condones por 7 d  as.
- Puede tener relaciones sexuales, nadar, ba  arse, hacer ejercicio f  sico y usar tampones en cuanto desee hacerlo.
- El efecto secundario m  s com  n del Liletta es sangrado irregular o manchas, aunque en general el flujo de sangre y los calambres son menos. Algunas mujeres podr  n experimentar s  lo manchas o no tener la menstruaci  n del todo varios meses despu  s de la inserci  n.

Regresar a la cl  nica:

- En su revisi  n anual o si tiene alg  n problema o alguna preocupaci  n.

Llame a la cl  nica:

- Si tiene una o m  s de las siguientes se  ales de infecci  n:
 - Temblores, escalofr  os, o una temperatura mayor de 101.0 grados.
 - Secreci  n vaginal de color verde o amarillo, maloliente o que se parezca a pus.
 - Severo dolor abdominal (estomacal) que no se alivia con medicamentos para el dolor.

Si experimenta cualquier de estos s  ntomas fuera de las horas h  biles:

- ◆ Llame al Hospital Universitario: (720) 848-9111
- ◆ Vaya a una cl  nica de cuidado urgente o al hospital m  s cercano, o llame al 911.

- Si cree estar embarazada.
- Si tiene sangrado vaginal anormal.
- Si usted o su pareja experimenta dolor durante las relaciones sexuales. (Su pareja podr  a sentir el hilo durante las relaciones, pero no le causar   dolor.)
- Si no puede sentir el hilo del IUD, si el hilo parece ser m  s largo, o si siente el extremo de pl  stico duro del IUD. Si esto ocurre, deber   revis  rse el IUD lo m  s pronto posible. Hasta que no se le haga la revisi  n, use otro m  todo para el control de la natalidad (espuma o condones).

Revisi  n del IUD:

- El IUD puede salirse del   tero y vagina sin que se de cuenta; por lo tanto es importante revis  rselo regularmente.
- Revisar su dispositivo cada mes. Preferible despu  s de cada periodo menstrual si tiene uno con su dispositivo.
- Revise la colocaci  n del IUD de la siguiente manera:
 - L  vese las manos con agua y jab  n. S  queselas con una toalla limpia.
 - Doble las rodillas y p  ngase en cuclillas o suba una pierna doblada sobre el excusado.
 - Con cuidado meta el dedo \'indice profundamente dentro de la vagina.
 - Busque su cerviz en la parte superior de la vagina (se siente como la punta de la nariz).
 - Sienta el hilo del IUD saliendo del centro de la cerviz. NO jale el hilo.
 - NO deber   poder sentir el pl  stico duro del IUD.
 - L  vese las manos cuando haya terminado la revisi  n del hilo.

*Nota: ¡Liletta IUD no la proteger   de enfermedades transmitidas sexualmente!

"Este folleto fue creado (en parte) con fondos federales de Office of Population Affairs (La Oficina de Asuntos de Poblaci  n) subsidio."