

Impétigo

¿Qué es el impétigo?

- Una infección de la piel que causa una erupción que a menudo ocurre en la cara, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo.
- Cualquier persona puede contraer impétigo, pero la infección es más común en niños pequeños de 2 a 5 años de edad.
- Es causada por bacterias estreptocócicas y estafilocócicas.



Imagen: dermnetnz.org

¿Cuáles son los síntomas?

- Protuberancias rojas y redondas que se convierten en llagas que se abren y filtran un líquido claro o pus.
- Las llagas a veces pican.
- A veces, se puede formar una costra "color miel" sobre la llaga.
- Las llagas sanan sin dejar cicatriz.

¿Cómo se contagia?

- El impétigo se transmite a otras personas cuando alguien toca esas llagas o entra en contacto con el líquido de las llagas.
- Por lo general, toma hasta 10 días para que la erupción aparezca después de una exposición.
- Comúnmente se propaga en escuelas y guarderías.
- La bacteria también puede propagarse a partir de objetos como ropa de cama y juguetes.

Tratamiento para el impétigo:

- El tratamiento con antibióticos puede ser uno que se frota sobre las llagas (antibióticos tópicos) o

que se toman por vía oral (antibióticos orales).

Prevención:

- Las personas pueden contraerlo más de una vez.
- Evite rascarse o tocar las llagas y las costras.
- Mantenga las llagas cubiertas con un vendaje.
- Lávese las manos regularmente y lávese las manos después de tocar cualquier cosa que pueda estar contaminada con líquido de las llagas.
- Use una toalla limpia o una toalla de papel fresca para secar el cuerpo o las manos;
- No comparta toallas, ropa y otros artículos personales con alguien que tenga impétigo.
- La limpieza y la atención inmediata a las heridas menores ayudarán a prevenir el impétigo.
- Lave la ropa, la ropa de cama y las toallas contaminadas.
- Limpie las superficies con productos antibacterianos.

Medidas de control:

- Informe la infección al director de la instalación o a la enfermera de la escuela.
- EXCLUYA a cualquier persona con impétigo hasta 24 horas después de que haya comenzado el tratamiento antibiótico.
- El impétigo puede propagarse en entornos atléticos. Los controles de la piel son importantes en la prevención de esta enfermedad y se recomiendan como parte de los protocolos de pesaje para los deportes de contacto.
- Los atletas deben permanecer fuera de la participación hasta que se hayan recibido tratamientos o las lesiones



Imagen: www.cdc.gov

¿Preguntas?

Comuníquese con Control de Enfermedades, Departamento de Salud del Condado de Adams al 720-769-7600 o envíenos un correo electrónico a: disease@adcogov.org